

НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ ЧЕРЕЗ:

- пот, мочу или слону;
- при чихании и кашле;
- в бассейне, туалете;
- через посуду, пищу,
- туалетные принадлежности;
- через рукопожатие
- и дружеский поцелуй;
- просто находясь в одном помещении с инфицированным,
- на производстве или дома;
- через укусы животных
- и насекомых;



комары, вши, клопы, другие кровососущие насекомые не могут быть переносчиками ВИЧ-инфекции, так как вирус в организме насекомых быстро гибнет под действием ферментов пищеварения. Если бы вирус иммунодефицита человека передавался насекомыми, заражались бы болели бы все слои населения, в том числе дети и старики.

ПОМНИТЕ!

Никогда нельзя быть уверенным в другом человеке. Поэтому, при возникновении ситуаций, которые могут привести к инфицированию:

в случае попадания крови, биологических жидкостей другого человека в глаза, рот - немедленно промыть глаза, прополоскать рот проточной водой;

если травма сопровождается повреждением кожи, зажать её возле укола или укуса и выдавить 2-3 капли крови, промыть поражённое место водой с мылом.

Затем обязательно обратиться в медицинскую часть для осуществления медицинской помощи дезинфекции поражённого места.

Наибольший риск заражения зависит от вашего поведения!

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать инфицирования ВИЧ, сохранит ваше здоровье и жизнь.



ТУБЕРКУЛЁЗ И СПИД

В чём опасность?

Иммунная система носителей ВИЧ утрачивает способность бороться с размножением и распространением микобактерий туберкулёза.

К ослаблению иммунной системы приводят:

- недостаточное, неполноценное питание
- хронический стресс
- курение
- алкоголизм
- применение гормональных препаратов
- ВИЧ/СПИД
- другие заболевания (сахарный диабет, язвенная болезнь, хронические заболевания лёгких)

Основные симптомы туберкулёза:

- длительный кашель (более трёх недель)
- боли в грудной клетке
- кровохарканье
- снижение массы тела
- потеря аппетита
- усиленное потоотделение (особенно в ночное время)
- общее недомогание и слабость
- периодическое повышение температуры тела



Ни в одной стране мира властям или медицинским работникам не удалось победить туберкулёз только своими силами...

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

163069, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 98

Программа "Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании" - 21 01 39

E-mail: aids@arh.ru

Программа "РКК против туберкулёза и СПИДа" - 21 00 65

ПРОГРАММЫ:
"Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании"
"РКК против туберкулёза и СПИДа"

АРХАНГЕЛЬСК

ЭТО
необходимо
знать
каждому...

ВИЧ/СПИД ТУБЕРКУЛЁЗ




ЧТО ТАКОЕ ВИЧ/СПИД?

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) повреждает иммунную систему человека, призванную защищать нас от различных болезней. Длительное нахождение вируса в организме приводит в конечном счете к возникновению СПИДа.

СПИД (Синдром Приобретенного Иммуно-Дефицита) - это группа тяжелых заболеваний на последней стадии ВИЧ-инфекции.

ВИЧ - вирус замедленного действия. Как правило, в течение нескольких лет (7-15) человек, живущий с ВИЧ, чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни, но может передавать вирус другим людям.

ВИЧ содержится в различных биологических жидкостях больного человека и передается при попадании этих жидкостей в организм другого человека. Наиболее опасны - сперма, кровь, вагинальные выделения. Хотя в небольших количествах вирус имеется в моче и слюне, передача его через эти жидкости невозможна, если в жидкостях нет видимых следов крови.



КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВИЧ?

1. При попадании зараженной крови в кровь и на поврежденные кожные покровы и слизистые здорового человека:

- через загрязненные шприцы, иглы и другие медицинские инструменты;
- при прокалывании ушей, нанесение татуировок;
- через загрязненные кровью маникюрные ножницы, лезвие бритвы;
- при переливании зараженной крови.

Если Вы используете наркотические вещества внутривенно, заражение ВИЧ-инфекцией в Вашем случае может происходить:

- при использовании "грязных" шприцев или "грязных" игл;
- при заборе наркотического вещества из общей ёмкости;
- при использовании зараженного в процессе производства или транспортировки наркотического вещества.



Чтобы не заразиться, необходимо:

использовать разовые медицинские инструменты и обязательно кипятить наркотическое вещество перед употреблением

обрабатывать инструменты для татуировки и бритвенные принадлежности хлорсодержащими дезинфицирующими растворами или кипятить.

2. Незащищенный половой контакт.

Никто без специальных лабораторных исследований не может определить, являетесь ли Вы, или Ваш сексуальный партнёр ВИЧ-инфицированным.

Особенно опасными для инфицирования являются:
— половые сношения через прямую кишку;
— секс в период менструации;
— секс между партнёрами, у которых имеются какие-либо воспалительные заболевания половых органов.

Риск заражения возрастает с увеличением количества сексуальных партнёров.

3. От ВИЧ-положительной матери к ребёнку

(во время беременности, в родах, при грудном вскармливании) и, наоборот, - от ВИЧ-инфицированного ребёнка к здоровой матери (при грудном вскармливании).



Иногда одного сексуального контакта с инфицированным партнёром бывает достаточно для заражения.

Презервативы хорошего качества со специальной смазкой на водной основе (ни в коем случае не крем и не вазелин!) сводят к нулю риск передачи ВИЧ и особенно необходимы при анальном сексе.



Презервативы надёжно защищают только в том случае, если ими пользоваться постоянно (при каждом половом акте с каждым партнёром) и правильно.

